Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$

1 Montrer que : $\exists ! x_n \in \left] \frac{\pi}{2} + n\pi; \frac{\pi}{2} + (n+1)\pi \right[: \tan x_n = x_n$

2 On considère la suite $(u_n)_n$ définie par : $(\forall n \geq 0) \quad u_n = \frac{\pi}{2} + (n+1)\pi - x_n$

a Montrer que : $(\forall n \geq 0) : x_n = (n+1)\pi + \arctan x_n$

b En déduire que : $(\forall n \geq 0) : u_n = \arctan \left(\frac{1}{x_n} \right)$

c Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$

d En déduire que la suite $(u_n)_n$ est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 2

Partie I :

1 On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(1+x)$

a Étudier les variations de la fonction g .

b En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.

2 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-x} \ln(1+e^x)$

a Montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

b Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

c Montrer que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = e^{-x} \left(\frac{e^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right)$$

d Étudier les variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

3 Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. (On prendra $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$)

4 a Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à déterminer.

b Donner les variations de f^{-1} sur J .

c Tracer la courbe de f^{-1} dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Partie II : On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $\forall n \geq 0 \quad u_{n+1} = f(u_n)$

1 a Montrer que si $x \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{5} \right]$, alors $f(x) \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{5} \right]$.

b Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α , et que dans $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq \frac{3}{5}$.

2 Étudier le signe de : $f(x) - x$

3 Pour tout n de $\mathbb{N}$, on pose : $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$

- a) Montrer que v_n et w_n sont adjacentes.
- b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente, et que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

Partie III :

1 a) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f'(x) + f(x) = \frac{1}{1 + e^x}$

b) En déduire la fonction primitive F de la fonction f sur $\mathbb{R}$, qui s'annule en 0.

2 a) Montrer que : $(\forall n \geq 2)(\exists! x_n \in \mathbb{R}_+^*) \quad f(x_n) = \frac{1}{n}$

b) Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est décroissante.

c) Démontrer que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ n'est majorée, puis en déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$

3 On considère la suite $(y_n)_{n \geq 2}$ définie par : $y_n = \int_0^{x_n} f(x) dx$

a) Montrer que la suite $(y_n)_{n \geq 2}$ est croissante, et que : $(\forall n \geq 2) \quad 0 \leq y_n \leq 2 \ln 2$.

b) Montrer que $(y_n)_{n \geq 2}$ est convergente et que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 2 \ln 2$.

Exercice 3

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}; \quad u_{n+1} = \frac{e^{u_n}}{u_n + 2}$

1 Étudier les variations de la fonction $f \mapsto \frac{e^x}{x+2}$.

2 a) Montrer que : $f([0; 1]) \subset [0; 1]$.

b) Montrer que : $\forall x \in [0; 1]; \quad \frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{2}{3}$

c) En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[0; 1]$

3 a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}; \quad u_n \in [0; 1]$.

b) En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

c) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}; \quad |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |u_n - \alpha|$.

d) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}; \quad |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

e) Déterminer les entiers n pour que u_n soit une valeur approchée de α à 10^{-3} près.

Exercice 4

Partie I : Soit $\mathbb{E} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$. Pour tout couple (a, b) de $\mathbb{E}^2$, on pose : $a \perp b = a + b - ab\sqrt{2}$

1 Vérifier que pour tout couple (a, b) de $\mathbb{E}^2$: $a \perp b = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} (a\sqrt{2} - 1)(b\sqrt{2} - 1)$

2 Montrer que $(\mathbb{E}, \perp)$ est un sous-groupe commutatif.

Partie II : On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire, de zéro la matrice $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

et d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

On considère l'ensemble : $\mathcal{F} = \left\{ M(a) = \begin{pmatrix} \sqrt{2} - a & a \\ a & \sqrt{2} - a \end{pmatrix} / a \in \mathbb{E} \right\}$.

On pose : $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

1 a Vérifier que : $A^2 = -2A$ et que $M(a) = I + \frac{a}{\sqrt{2}}A$

b Montrer que $\mathcal{F}$ est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

2 On considère l'application φ de $(\mathbb{E}, \perp)$ vers $(\mathcal{F}, \times)$ définie par : $\varphi(a) = M(a)$

a Montrer que φ est un isomorphisme de vers

b En déduire la structure de $(\mathcal{F}, \times)$

Exercice 5

1 On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $195x - 232y = 1$

a Déterminer le plus grand diviseur commun des nombres 195 et 232.

b Montrer que l'ensemble solution de l'équation (E) est :

$$S = \left\{ (163 + 232k; 137 + 195k) / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

c Trouver l'unique entier naturel d vérifiant : $0 \leq d \leq 232$ et $195d \equiv 1[232]$

2 Montrer que le nombre 233 est premier.

3 Soit A l'ensemble des nombres entiers compris entre 0 et 232.

On considère l'application f de A vers A définie par : quel que soit a de A , $f(a)$ est le reste de la division euclidienne du nombre a^{195} par 233.

a Montrer que : $(\forall a \in A \setminus \{0\}) ; a^{232} \equiv 1[233]$

b Montrer que : $\forall (a, b) \in A^2$, si $f(a) = f(b)$, alors $a = b$

c Soient a et b deux éléments de A tel que : $f(a) = b$, déterminer a en fonction de b .

d En déduire que f est une bijection, puis déterminer sa bijection réciproque f^{-1} .

Exercice 6

On pose $E = \{0, 1, 2, \dots, 25\}$. Soient a et b deux éléments de E .

On considère l'application de E vers E définie par : $(\forall n \in E); \varphi(n) = an + b$

1 On suppose que : $\varphi(5) = 10$ et $\varphi(19) = 14$.

a Montrer que : $14a \equiv 4[26]$.

b Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $14x - 26y = 1$.

c En déduire la valeur de a et la valeur de b .

2 On suppose que $a = 15$ et $b = 3$.

- a Montrer que si $\varphi(n) = \varphi(p)$, alors $n = p$.
- b Soient n et m deux éléments de E tel que $\varphi(n) = m$, déterminer n en fonction de m .
- c En déduire que φ est une bijection de E vers E , puis déterminer sa bijection réciproque φ^{-1} .

Exercice 7

Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par : $f(t) = \ln(1+t) + \frac{t^2}{1+t^2}$

- 1
 - a Montrer que f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.
 - b Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t}$.
 - c Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 2 Soit n un entier naturel non nul. On considère l'équation $(E_n) : f(t) = \frac{1}{n}$.
 - a Montrer que l'équation (E_n) admet une solution unique a_n .
 - b Montrer que f admet une bijection réciproque f^{-1} définie sur $[0, +\infty[$
 - c Donner le tableau de variations de f^{-1} .
 - d En déduire les variations de la suite $(a_n)_{n \geq 1}$, puis déterminer sa limite.

- 3
 - a Calculer $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t}$.
 - b En déduire la limite de suite la $(na_n)_{n \geq 1}$.

Exercice 8

Soit n un nombre entier naturel non nul.

On considère la fonction h_n définie sur $]0, +\infty[$ par : $h_n(x) = \frac{xe^{-x}}{x^n} - x^n$, et la fonction φ définie sur $]0, +\infty[$ par : $\varphi_n(x) = e^{-x} - x^{2n-1}$

- 1
 - a Vérifier que : $(\forall n \geq 1) (\forall x > 0) : h_n(x) = 0 \Leftrightarrow \varphi_n(x) = 0$
 - b En déduire que pour tout entier naturel n non nul, l'équation $h_n(x) = 0$ admet une solution unique u_n , tel que : $0 < u_n < 1$
- 2
 - a Montrer que : $(\forall n \geq 1) : \ln(u_n) = -\frac{u_n}{2n-1}$
 - b En déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

Exercice 9

On considère la fonction f définie sur $[0, 1]$ par : $f(x) = 2xe^x$

- 1
 - a Montrer que f admet une bijection réciproque f^{-1} de $[0, 1]$ sur un intervalle J à déterminer.
 - b Donner le tableau de variations de f^{-1} .
- 2 Montrer que : $\exists! \alpha \in [0, 1] : \alpha e^\alpha = 1$, et que $\alpha \neq 0$.
- 3 On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 = \alpha$ et $(\forall n \geq 0) u_{n+1} = f^{-1}(u_n)$

- a) Montrer que : $(\forall n \geq 0) u_n \in]0, 1]$.
- b) Montrer que : $(\forall x \in [0, 1]) f(x) \geq x$.
- c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement décroissante.
- d) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente et calculer sa limite.

4 Pour tout entier naturel n , on pose : $S_n = \sum_{k=0}^{k=n} u_k$

- a) Montrer que : $(\forall n \geq 0) u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n e^{-u_{n+1}}$.
- b) En déduire que : $(\forall n \geq 0) u_n = \frac{e^{-S_n}}{2^n}$.
- c) Montrer que : $(\forall n \geq 0) u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
- d) En déduire que la suite $(S_n)_n$ est convergente et que sa limite ℓ vérifiant : $\alpha \leq \ell \leq 2$

Exercice 10

On considère la fonction :
$$\begin{cases} f(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{t} e^{-t^2} dt, & x \neq 0 \\ f(0) = \ln 2 \end{cases}$$

1 Montrer que la fonction f est paire.

2 a) Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que : $f'(x) = \frac{e^{-4x^2}}{x} (1 - e^{3x^2})$

b) En déduire le sens de variation de f sur $]0, +\infty[$.

3 a) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}) e^x \geq x + 1$

b) Montrer que : $(\forall t > 0) \frac{1}{t} - t \leq \frac{1}{t} e^{-t^2} \leq \frac{1}{t}$

c) Montrer que : $(\forall x > 0) \ln 2 - \frac{3x^2}{2} \leq f(x) \leq \ln 2$

d) Montrer que f est continue et dérivable en 0.

4 a) Montrer que : $(\forall t \geq 1) e^{-t^2} \leq e^{-t}$

b) En déduire que : $(\forall x \geq 1) 0 \leq f(x) \leq \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x}$

c) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

5 a) Donner le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

b) Tracer la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé.

Exercice 11

On rappelle que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif et $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire dont le zéro est la matrice nulle $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et dont l'unité est la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

On considère l'ensemble $\mathbb{E} = \left\{ M(a, b) = \begin{pmatrix} a+b & -b \\ 5a & a-3b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$

- 1** a) Montrer que $(\mathbb{E}, +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel réel.
 b) Déterminer une base de l'espace vectoriel $(\mathbb{E}, +, \cdot)$, puis en déduire sa dimension.
- 2** Soit α un nombre complexe n'appartenant pas à $\mathbb{R}$. Montrer que la famille $(1, \alpha)$ est une base de l'espace vectoriel réel $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.
- 3** On considère l'application φ de $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ vers $\mathbb{E}^* = \mathbb{E} \setminus \{M(0, 0)\}$ définie par :
- $$(\forall z = a + b\alpha \in \mathbb{C}^*) \quad \varphi(z) = M(a, b)$$
- a) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(\mathbb{E}^*, \times)$.
 b) Montrer que φ est une bijection.
- 4** On prend $\alpha = -1 + i$.
- a) Montrer que $(\mathbb{E}^*, \times)$ est un groupe commutatif.
 b) Montrer que $(\mathbb{E}^*, +, \times)$ est corps commutatif.
 c) Déterminer l'inverse de $M(a, b)$.

Exercice 12

n est un entier naturel non nul.

Partie I : On considère la fonction g_n définie sur $\mathbb{R}$ par : $g_n(x) = 1 + x - e^{-nx}$

- 1** a) Étudier les variations de la fonction g_n .
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g_n(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x)$, puis donner le tableau de variations de la fonction g_n .
 c) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g_n(x)}{x}$, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.
 d) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g_n(x) - x - 1)$, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.
 e) En déduire que $x_0 = 0$ est l'unique solution de l'équation $g_n(x) = 0$.
 f) Tracer la courbe de la fonction g_1 dans un repère orthonormé.
- 2** a) Montrer que : $(\forall n \geq 1) (\exists! x_n > 0) \quad g_n(x) = 1$.
 b) Étudier le signe de $g_{n+1}(x) - g_n(x)$.
 c) En déduire que la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.
 d) Montrer que : $(\forall n \geq 1) \quad x_n = e^{-nx_n}$.
 e) En déduire la limite de la suite $(x_n)_{n \geq 1}$.

Partie II : On considère la suite $(y_n)_{n \geq 1}$ définie par : $y_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*; \quad y_{n+1} = e^{-y_n}$

- 1** Montrer que x_1 est l'unique solution de l'équation $e^{-x} = x$ et que $\frac{1}{e} \leq x_1 \leq 1$.
- 2** a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*; \quad \frac{1}{e} \leq y_n \leq 1$
 b) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*; \quad |y_{n+1} - x_1| \leq e^{-\frac{1}{e}} |y_n - x_1|$
 c) Montrer que la suite $(y_n)_{n \geq 1}$ est convergente et déterminer sa limite.

Partie III : On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $F(0) = \frac{1}{2}$ et $(\forall x > 0); F(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{g_1(t)} dt$

1 a Montrer que : $(\forall t > 0) ; \frac{1}{1+t} \leq \frac{1}{g_1(t)} \leq \frac{1}{t}$

b En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

2 a Montrer que : $(\forall t > 0) ; 1 - t \leq e^{-t} \leq 1 - t + \frac{t^2}{2}$

b En déduire que F est continue à droite au point 0.

c Étudier la dérivabilité de la fonction F à droite au point 0.

3 a Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et calculer $F'(x)$ pour tout $x > 0$.

b Étudier les variations de la fonction F sur $\mathbb{R}_+$.

c Construire la courbe de la fonction F dans une repère orthonormé.

Exercice 13

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{e^x}{1+x^2}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 a Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter géométriquement les résultats obtenus.

b Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$ et donner le tableau de variations de f .

c Calculer $f''(x)$, puis montrer que l'équation $f''(x) = 0$ admet deux solutions sont 1 et β tels que : $-\frac{1}{5} < \beta < 0$.

d En déduire le point d'inflexion de la courbe (C) , puis tracer la courbe (C) .

2 a Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}_+$. Soit g sa bijection réciproque.

b Montrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$, donner le sens de variation de g et calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

c Montrer que : $(\forall n \geq 1) (\exists! \alpha_n < 0) ; g\left(\frac{1}{n}\right) = \alpha_n$

d Calculer α_1 et déterminer le sens de variation de la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$.

e Montrer que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ n'est pas minorée, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$.

3 Pour tout x de $\mathbb{R}$, on pose : $F(x) = \int_0^x f(t)dt$

a Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $F'(x)$, puis en déduire le sens de variation de F sur $\mathbb{R}$.

b Vérifier que : $(\forall t \leq 0) ; 0 \leq f(t) \leq e^t$, puis en déduire que : $(\forall x \leq 0) ; -1 \leq F(x) \leq 0$.

c En utilisant la méthode d'intégration par parties, montrer que :

$$(\forall x \geq 0) ; F(x) = f(x) - 1 + 2I(x) \text{ où } I(x) = \int_0^x \frac{te^t}{(1+t^2)^2} dt$$

d En déduire : $\lim_{n \rightarrow +\infty} F(x)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$.

e) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \int_{\frac{1}{n}}^1 g(t) dt + \frac{\alpha_n}{n} = F(\alpha_n)$.

f) En déduire que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; -1 \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 g(t) dt \leq 0$.

Exercice 14

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

À tout point M d'affixe z différente de 0 , on associe le point M' d'affixe $z' = -\frac{1}{z}$.

1 Montrer que les points O, M et M' sont alignés.

2 Montrer que : $\overline{z' + 1} = \frac{1}{z}(z - 1)$

3 On considère les points A d'affixe 1 et B d'affixe -1 . Soit (C) le cercle de centre A qui passe par le point O . On suppose que le point M appartient au cercle (C) et différente de O .

a) Montrer que : $|z - 1| = 1$ et que $|z' + 1| = |z'|$, puis interpréter géométriquement ce résultat.

b) En déduire une construction géométrique du point M' connaissant le point M .

4 Soit M_1 le symétrique de M par rapport à l'axe réel (l'axe des abscisses).

a) Calculer $\frac{z' + 1}{z' - 1}$ en fonction de z .

b) Calculer $\arg\left(\frac{z' + 1}{z' - 1}\right)$ en fonction de la mesure de l'angle $(\overrightarrow{M_1A}; \overrightarrow{M_1B})$.

c) Comparer les mesures d'angles $(\overrightarrow{M_1A}; \overrightarrow{M_1B})$ et $(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB})$.

d) Montrer que M' appartient au cercle circonscrit au triangle AMB .

Exercice 15

1 On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = 0$.

a) Montrer que l'équation (E) admet une solution imaginaire pure z_0 .

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .

2 Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectivement $i, 2 + 3i$ et $2 - 3i$.

a) On considère R la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{4}$. Déterminer l'affixe de A' l'image de A par la rotation R .

b) Montrer que les points A', B et C sont alignés.

c) Donner l'écriture complexe de l'homothétie h de centre B qui transforme C en A .

d) Vérifier que : $h^{-1} \circ R(A) = C$, puis donner l'écriture complexe de l'application $h^{-1} \circ R$.

Exercice 16

Soit z un nombre complexe non nul tel que : $z = a + ib = [\rho, \theta]$.

1 En utilisant la figure ci-dessous, montrer que : $\theta \equiv 2 \arctan\left(\frac{b}{a + \rho}\right) [2\pi]$

2 En déduire que : $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$ (indication : poser $z = \sqrt{3} + i$).

🌐: www.elmaths.com

f: [www.fb.com/elmaths1](https://www.facebook.com/elmaths1)

2BAC-SM

www.elmaths.com